

Beratungshotline 0800 100 833 6
(kostenlos) www.novalac.de

Novalac bietet ein großes Sortiment an individuellen Nahrungen, die speziell an die ernährungsbedingten Bedürfnisse der Säuglinge und Kleinkinder angepasst sind.

ANWENDUNG

• **Novalac AR Plus** ist eine andickende Spezialnahrung von Geburt an, die speziell auf die Ernährungsbedürfnisse von Säuglingen mit starkem Spucken und Aufstoßen sowie gastro-ösophagealem Reflux abgestimmt ist.
• **Novalac AR Plus** enthält einen einzigartigen Andickungskomplex, den PAX-Complex, der die Wirkung von Maniokstärke und natürlichen Ballaststoffen kombiniert. Dieser bewirkt eine Andickung der Nahrung und verhindert effektiv den Rückfluss der Nahrung aus dem Magen in die Speiseröhre.

DOSIERUNG

Alter (Monate)	0-1	1-2	2-4	4-6	6-12	12-36
Anzahl Fläschchen pro Tag	6	5	5	4	3*	2*-3*
Anzahl Messlöffel	3	4	5	7	7	8
Abgekochtes Wasser (ml)	90	120	150	210	210	240

* als Teil einer abwechslungsreichen Ernährung

Standardauflösung: 13 g Pulver + 90 ml abgekochtes Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung.

1 gestrichener Messlöffel entspricht ca. 4,3 g **Novalac AR Plus**

Nach Rücksprache mit Ihrem Kinderarzt sollen Trinkmengen und Anzahl aller Mahlzeiten auf die Bedürfnisse Ihres Babys abgestimmt werden. Die angegebenen Trinkmengen und Anzahl an Fläschchen pro Tag sind empfohlene Richtwerte.

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zum Diätmanagement bei vermehrtem Spucken und Aufstoßen.

e 800 g

20G5M08E ET1550701 30161454



PZN - 20005732

Unter Schutzatmosphäre verpackt. Die Dose, die Siegel-/Originalitäts-Alufolie, der Messlöffel und der Plastikdeckel können recycelt werden.

WICHTIGE HINWEISE Muttermilch ist die beste Ernährung für Ihr Baby! **Novalac AR Plus** ist von Geburt an zur ausschließlichen und ergänzenden Ernährung von Säuglingen geeignet, wenn nicht oder nur teilweise gestillt wird. Ab dem 6. Monat sollte **Novalac AR Plus** in Absprache mit Ihrem Kinderarzt mit Breimahlzeiten kombiniert werden. **Novalac AR Plus** nicht anwenden bei Kuhmilchproteinallergie, Frühgeburt, geringem Geburtsgewicht oder bei Säuglingen mit geschwächtem Immunsystem. Die Proteinquelle in **Novalac AR Plus** ist Kuhmilchprotein. Das Produkt ist nicht für die parenterale Ernährung sowie zur Sondenernährung geeignet. Bitte wenden Sie **Novalac AR Plus** nur unter ärztlicher Kontrolle an.

SICHERHEITSHINWEISE

- Mindestens haltbar bis: siehe Bodenaufdruck der Dose.
- Beim ersten Öffnen Metallfolie komplett entfernen.
- Nach Öffnen der Dose innerhalb von max. 3 Wochen aufbrauchen.
- Dose nach Gebrauch gut mit dem Plastikdeckel verschließen, trocken und kühl aufbewahren.
- Ein zu langes und häufiges Nuckeln bei der Gabe der Flaschennahrung vermeiden, um Karies zu verhindern.
- Putzen Sie die Zähne Ihres Babys immer nach der letzten Flasche.
- Flasche immer direkt vor dem Füttern zubereiten und nicht vorbereiten.
- Flasche innerhalb 1 Stunde nach Zubereitung verbrauchen und Reste nicht wieder aufwärmen, sondern verwerfen.
- Keinen Zucker hinzufügen.
- Nicht geeignet zur Sondenernährung.
- Nicht zur parenteralen Verwendung geeignet.

Hergestellt in Deutschland von
Laboratoires Novalac SA, Genf

Vertrieb durch **Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG**, Herzbergstraße 3,
ENGELHARD D-61138 Niederdorfelden, www.novalac.de

Novalac

AR Plus

Zum Diätmanagement
bei vermehrtem Spucken
und Aufstoßen

✓ Komplex andickender
Inhaltsstoffe



Spezialnahrung
0-36 Monate

800 g

NÄHRWERTE

	im Durchschnitt	100g Pulver	100ml trinkfertige Nahrung
Energie	kJ	2097	273
	kcal	501	65
Fett	g	25,1	3,3
davon			
- gesättigte Fettsäuren	g	11,2	1,5
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren	g	5,1	0,7
- Linolensäure	mg	4500	600
- Alpha-Linolensäure	mg	405	53
- DHA (Docosahexaensäure)	mg	120	16
- ARA (Arachidonsäure)	mg	30	4
Kohlenhydrate	g	57,2	7,4
davon			
- Zucker	g	30,3	3,9
- Stärke	g	1	0,1
Ballaststoffe	g	1,9	0,2
Eiweiß (Kuhmilchprotein)	g	10,4	1,4
Salz	g	0,475	0,06
Vitamine			
Vitamin A	µg	425	55
Vitamin D	µg	11,5	1,5
Vitamin K	µg	60	7,8
Vitamin C	mg	65	8,5
Thiamin	mg	0,8	0,10
Riboflavin	mg	1,2	0,2
Vitamin B6	mg	0,5	0,07
Niacin	mg	4,5	0,6
Folsäure	µg	85	11
Vitamin B12	µg	1,5	0,2
Pantothensäure	mg	4,9	0,6
Biotin	µg	18	2,3
Vitamin E	mg	8,7	1,1
Mineralstoffe			
Natrium	mg	190	25
Chlorid	mg	445	58
Kalium	mg	590	77
Calcium	mg	525	68
Phosphor	mg	335	44
Magnesium	mg	53	6,9
Eisen	mg	5,3	0,7
Zink	mg	4	0,5
Kupfer	mg	0,38	0,05
Jod	µg	95	12
Selen	µg	22	2,9
Mangan	mg	0,041	0,005
Chrom	µg	<45	<5,9
Molybdän	µg	<45	<5,9
Fluorid	mg	<0,45	<0,06
Weitere Inhaltsstoffe			
Cholin	mg	170	22
Inositol	mg	80	10,4
Taurin	mg	40	5,2
L-Carnitin	mg	20	2,6

ZUTATEN Magermilch, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Palm-, Soja- und Kokosnussöl), Lactose (aus Milch), Verdickungsmittel (Pektin, Johannisbrotkernmehl), Maniokstärke, Fischöl (DHA) (mit Milch), Emulgator (Lecithin [Soja]), Tricalciumcitrat, Cholinbitartrat, Calciumchlorid, Magnesiumchlorid, Vitamine (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, Biotin, Folsäure, Niacin, Pantothensäure), L-Cystin, Inositol, Mortierella-alpina-Öl (ARA) (mit Milch), Dikaliumphosphat, L-Tryptophan, Taurin, Trinatriumcitrat, Dinatriumphosphat, Eisensulfat, L-Carnitin, Zinksulfat, Trimagnesiumcitrat, Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte), Natriumselenit, Kupfersulfat, Kaliumjodid, Mangansulfat.

ZUBEREITUNG Für die Gesundheit Ihres Babys ist es wichtig, die Hinweise zur hygienischen Zubereitung genau zu beachten. Unsachgemäße Zubereitung und Lagerung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.

- 1 Flasche, Sauger und die dazugehörigen Materialien reinigen und sterilisieren.
- 2 Frisches Leitungswasser 5 Minuten lang abkochen und auf Raumtemperatur abkühlen lassen oder raumtemperiertes Flaschenwasser mit einem geringen Mineralstoffgehalt verwenden.
- 3 Die nötige Menge Wasser in die Flasche füllen.
- 4 Die entsprechende Menge Pulver mit dem in der Packung liegenden Messlöffel dazugeben und die Flasche mit dem Deckel verschließen.
Für eine vollständige Auflösung des Pulvers und der Vermeidung von Klümpchen bitte wie folgt vorgehen:
- 5 Die Flasche mindestens 5 Sekunden zwischen den Handflächen rollen.
- 6 Dann die Flasche heftig für mindestens 10 Sekunden von oben nach unten schütteln.
- 7 Die zubereitete Milch auf 37 °C erwärmen.
- 8 Sauger aufsetzen und die Flasche erneut heftig für 10 Sekunden schütteln.
- 9 Die Temperatur an der Innenseite des Handgelenks prüfen und sofort geben.

Novalac AR Plus benötigt keine Standzeit zur Andickung, sondern kann direkt gegeben werden.

Wegen der besonderen Zusammensetzung ist es möglich, dass Sie die Flasche mit **Novalac AR Plus** etwas mehr schütteln müssen, um das Pulver aufzulösen. Da **Novalac AR Plus** im Gegensatz zu Standardnahrungen bereits im Fläschchen andickt, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines speziellen Milchsaugers. Ohne die Gesundheit Ihres Babys zu beeinträchtigen kann **Novalac AR Plus** kleine dunkle Teilchen pflanzlichen Ursprungs (Johannisbrotkernmehl) sowie weiße Bestandteile der natürlichen Ballaststoffe enthalten. Der Inhaltsstoff Johannisbrotkernmehl kann zu einer Veränderung des Stuhlgangs (weichere Stühle) führen.